ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток.**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток.**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток.**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток.**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток**

ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д.
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать!
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), ферментные препараты (мезим и т.д.).
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить непосредственно перед исследованием.
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не ранее, чем через **7 суток.**