Подготовка на МРТ органов малого таза - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг)+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования	**Подготовка на МРТ органов малого таза** - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг)+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования
Подготовка на МРТ органов малого таза - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг))+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования	**Подготовка на МРТ органов малого таза** - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг)+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования.
Подготовка на МРТ органов малого таза - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг))+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования	**Подготовка на МРТ органов малого таза** - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг)+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования
Подготовка на МРТ органов малого таза - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг))+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования	**Подготовка на МРТ органов малого таза** - За день до обследования исключить продукты вызывающие повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, виноград и тд.) - в день обследования голод за 4 часа до исследования; - за 1 час до обследования опорожнить мочевой пузырь, при целенаправленном обследовании мочевого пузыря опорожнение за 2 часа; - за 30 мин. до обследования выпить 3 таб.НО-ШПЫ по 40 мг(120 мг)+эспумизан 2 таб 3 р/день-за день до исследования и 2 таб за час до исследования.